Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации (РМП)

Product Categories: Отборочные методы

Product Page:

http://ivdvlmedia.ru/shop/mikrobiologicheskaya-diagnostika/bakteriologiya/serologicheskiy-metod/diagnostikumy/diagnostika-sifilisa-diagnostikumy/antigen-kardiolipinovyj-dlya-reakcii-mikroprecipitacii-rmp/

Product Summary

Кат.№ M1 VL 10фл.х2мл+2фл.х5мл

Product Description

Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации (РМП)

Набор реагентов Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации (РМП) предназначен для диагностики сифилиса при помощи реакции микропреципитации.

1000 определений -Антиген кардиолипиновый для РМП представляет собой раствор трех высокоочищенных липидов: кардиолипина (0,03 %), лецитина (0,27%), холестерина (0,9 %) в спирте этиловом абсолю-тированном - 10фл.х2 мл -Раствор холин-хлорида 70 % представляет собой холин-хлорид в натрия хлорида растворе 0,9 % - 2 фл.х5 мл АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

При исследовании плазмы и инактивированной сыворотки крови от больных сифилисом в РМП с антигеном должна наблюдаться положительная реакция в виде выпадения хлопьев разной величины, а с плазмой или инактивированной сывороткой от здоровых лиц - отрицательная реакция в виде опалесценции.

При постановке РМП с контрольными инактивированными сыворотками больных сифилисом анти-ген должен давать положительную реакцию. Антиген должен давать отрицательную реакцию с сыворот-ками здоровых лиц.