Набор для исследования на гельминты (по Рабиновичу), Россия

Product Categories: Наборы реагентов
Product Page:
http://ivdvlmedia.ru/shop/obshheklinicheskie-issledovaniya/mikroskopiya-obshheklinicheskie-issledovaniya/issledovanie-kala/nabory-reagentov-issledovanie-kala/nabor-dlya-issledovaniya-na-gelminty-po-rabinovichu-rossiya/

Product Summary

Кат.№НКГPVL

Набор для исследования на гельминты (по Рабиновичу)
Набор реагентов для исследования по Рабиновичу предназначен для выявления яиц гельминтов методом исследования перианальных складок.
*Набор обеспечивает 50 исследований (при расходе 1 мл клеевого состава на 1 глазную лопатку.

Product Description

Набор для исследования на гельминты (по Рабиновичу)
Набор реагентов для исследования по Рабиновичу предназначен для выявления яиц гельминтов методом исследования перианальных складок.
Принцип реакции:
Принцип: яйца гельминтов обнаруживают в перианальных соскобах, сделанных с помощью клеевого слоя.
Реагенты:
Клеевой состав (По Рабиновичу) 1 фл (50 мл)
Глазные лопатки 50 шт
Оборудование.

-термостат;	-секундомер;
-микроскоп;	-цилиндры мерные вместимостью 25-500мл;
-колбы вместимостью 500,1000мл;	-стаканчики химические;
-чашки Петри;	-стеклянные палочки;
-пипетки;	-стекла предметные;
-воронка;	-глазные палочки
-бумага фильтровальная;	-перчатки резиновые;
-штатив для глазных палочек	

Методика :
Подготовка глазных палочек: Подготовить стеклянные глазные палочки: промыть, обезжирить и простерилизовать (кипячением или автоклавированием), высушить; сухую лопаточку глазной палочки обмакнуть в клей; просушить не менее 2-4 ч (глазная палочка при этом должна находиться лопаточкой вверх для стекания избытка клея и образования равномерной пленки). Клей, обтекая лопаточку, образует прозрачную клейкую пленку, сохраняющуюся после высыхания не менее недели (что позволяет готовить палочки заранее). Установить глазные палочки в специальный штатив, где каждая ячейка имеет свой номер, или использовать пронумерованные пенициллиновые флаконы, предварительно закрепив ручку глазной палочки в резиновой пробке от этого пузырька.
Ход обнаружения:
Взять соскоб путем соприкосновения или "отпечатка" плоской частью лопаточки обеих сторон с кожей перианальных складок. Снова укрепить палочку в штативе или пенициллиновых пузырьках (промаркированных соответственно номеру, присвоенному обследуемому по списку, или регистрационному номеру в журнале) для доставки в лабораторию.

Укрепить глазную палочку в специальном держателе для просмотра под микроскопом. Микроскопировать непосредственно плоскую поверхность лопаточки поочередно с обеих сторон при увеличении: окуляр х 7 или х 10, объектив х 8 или х 10. Использованные палочки дезинфицировать кипячением в мыльном растворе, тщательно промыть, прополоскать, обезжирить, просушить в сухожаровом шкафу. Штатив и кассеты обработать 70%-ным спиртом и промыть мыльно - содовым раствором. Пенициллиновые пузырьки и резиновые пробки дезинфицировать кипячением или автоклавированием.